

Tuberkuloosiregistrile andmete edastamise juhend

Tuberkuloosiregistri aadress: Tervise Arengu Instituut (TAI), Paldiski maantee 80, Tallinn 10617

Kontakttelefon: 57493900

e-posti aadressid: tuberkuloosiregister@tai.ee; piret.viiklepp@tai.ee; kersti.villand@tai.ee

Tuberkuloosiregistrisse saab andmeid edastada TAI registrite elektroonsete andmete edastamise portaali kaudu. Portaali kasutamise juhend avaneb portaalis.

Portaal asub lingil: <https://registrid.tai.ee>

Sinna tuleb sisse logida oma ID-kaardiga, esimesel korral tuleb taotleda ligipääsuõigus ning teile avatakse registrile andmete saatmise võimalus – palun valige tuberkuloosiregister.

Teised andmete edastamise võimalused on:

- Täitke ekraanilt täidetav andmekaart ja saatke krüpteeritult e-maili lisana tuberkuloosiregister@tai.ee
- Saatke täidetud andmekaart tähitud postiga TAI aadressile.

Ekraanilt täidetava andmekaardi leiab ka TAI kodulehel  [Tuberkuloosihaige ekraanilt täidetav andmekaart](#)

Tuberkuloosihaige andmekaardi täitmise juhend

Tuberkuloosihaige andmekaart täidetakse kõigi Eestis diagnoositud tuberkuloosi haigusjuhtude kohta, mis on diagnoositud elupuhuselt või pärast surma, olenemata sellest, kas tuberkuloos on põhihaigus või kaasuv haigus.

Raviarst täidab andmekaardi pärast iga tuberkuloosi (TB) ravikuuri alustamist või kui ravi ei alustatud, siis pärast TB diagnoosi kinnitumist. Andmekaardid palume saata tuberkuloosiregistrile hiljemalt ravi alustamisele järgneva kuu 15. kuupäevaks.

Raviarst või patoloog, kes diagnoosib surma põhjusena tuberkuloosi või tuberkuloosi kaasuva haigusena, sisestab andmed portaali või täidab andmekaardi ning edastab selle tuberkuloosiregistrile hiljemalt ühe kuu jooksul pärast diagnoosimist.

Andmekaardile kantud andmete õigsuse eest vastutab teatise täitja.

A. Nõuded vormistamisel

Kuupäevad kirjutada vormis päev (xx), kuu (xx), aasta (xxxx).

Diagnoosi kirjutamisel kasutada rahvusvahelist haiguste klassifikatsiooni (RHK-10).

Andmekaart täita eesti keeles.

P 1: Seisund ravi alustamisel (vt punkt **B. Mõisted**)

P 3, 9-15, 20-23, 26-28: Küsitud tunnuse vastuste valiku olemasolul **tähistatakse õige valik juuresolevas kastis ristiga.**

P 2, 4-6: Valiku puudumisel kirjutatakse **andmed trükitähtede** või **numbritega.**

P 7 **Sünnimaa**, juhul kui sünnimaa pole Eesti, siis täita Eestisse saabumise aeg: päev (xx), kuu (xx), aasta (xxxx), kui kuupäev teadmata, kirjutada **aasta.**

P 7-14, 20-28: Kui andmed puuduvad, siis jätta väljad tühjaks.

P 15: Reisimise nakkuslikul perioodil

Reisimise andmed täpsustada märkuste lahtris: lennu-, laeva-, bussireisi kuupäevad, reisi-või transpordi firma ja sihtriik.

Need andmed edastab Tuberkuloosiregister Terviseametile. (Reeglina peetakse nakkuslikuks perioodiks kolme kuud enne kopsutuberkuloosi diagnoosimist. Andmed palume edastada, kui patsient on viibinud nakkuslikul perioodil üle 8 tunni kestnud reisirajal, 8 tunni sisse arvestatakse ka lennureiside ootesaali aeg)

P 16-17: **Töötaval isikul amet ja töökoht**, pensionäril või töötul viimane amet ja töökoht.

Kui tegevusala on **õpilane/üliõpilane** või **hoolealune**, palun kirjutada õppeasutuse, hoolekandetasutuse nimi ja aadress, need andmed edastab Tuberkuloosiregister Terviseametile.

Kui isik töötab **hoolekande- või tervishoiu asutuses, laste-või õppeasutuses või toidukäitlejana**, on lisaks töökohta nimele vaja ka **töökohta aadressi**, kuna need andmed edastab Tuberkuloosiregister Terviseametile. Kui isik on enne TB diagnoosimist nakkuslikul perioodil (reeglina 3 kuud enne diagnoosimist) töötanud **välisriigis**, lisada vastavad andmed.

P 18: Surma põhjus - surma põhjustanud põhihaigus RHK-10 koodina või sõnaliselt.

P 19: TB põhihaiguse diagnoos ja kaasuva haiguse diagnoos kirjutada sõnaliselt ja RHK-10 koodina.

P 23: HIV

HIV testi kuupäev: HIV positiivse patsiendi puhul – kuupäev, millal esmakordselt diagnoositi HIV positiivsus; HIV negatiivse patsiendi puhul – viimase HIV testi tegemise kuupäev;

ARV ravi kuupäev – ARV ravi alguskuupäev; kui see pole teada, vastata HIV positiivse patsiendi puhul kas „jah“ või „ei“;

CD4 – CD4 rakkude arv TB ravi alustamisel;

VK arv – viiruskoopiate arv TB ravi alustamisel.

B. Mõisted

TB-juht on haigusjuht, kui patsiendil on kliiniliselt diagnoositud ja/või bakterioloogiliselt või histoloogiliselt kinnitatud mistahes aktiivse tuberkuloosi vorm.

Esmane (uus) haigusjuht – TB on inimesel diagnoositud esmakordselt elus, haige pole varem TB-vastaseid ravimeid kasutanud või on võtnud ravimeid vähem kui üks kuu.

TB retsidiivjuht – Korduv tuberkuloosi haigestumine on uuesti diagnoositud inimesel, kes on TB varem põdenud, saanud tuberkuloosi ravi ja paranenud.

Mitteefektiivne (tulemuseta) ravi – 5 kuud pärast ravi algust, MDR haigustekitaja korral 12 kuud, on TB-haige jätkuvalt bakterieritaja või ravi ajal uuesti muutunud bakterieritajaks ning alustatakse uut ravikuuri. Ravi lõpetamisel nimetatakse mitteeffektiivseks raviks juhud, kui arst või arstide konsiilium otsustab TB ravi mitte jätkata kas kaasnevate haiguste või raskete kõrvaltoimete esinemise tõttu.

Jälgimiselt kadunud (end. ravikatkestaja) – TB haige alustas ravijuhendi kohast ravikuuri, kuid katkestas omavoliliselt ravi vähemalt kaheks kuuks või TB ravi pole alustatudki, kuna patsient on jälgimiselt kadunud või TB ravi alustanud patsient on Eestist lahkunud ja tema kohta edasised andmed puuduvad.

Üle tulnud teisest piirkonnast – TB-haige, kes on üle tulnud teisest piirkonnast, kus TB on diagnoositud, alustatud TB- ravi ja seal ka registreeritud (esimene andmekartaad saadetud).

C. Kasutatavad klassifikaatorid ja lühendid

RHK-10 – rahvusvaheline haiguste ja tervisega seotud probleemide statistiline klassifikatsioon

TB – tuberkuloos

ARV – antiretroviirusravi

VK arv – viiruskoopiate arv ehk viiruskoormus (HIV-pcR-RNA)