

Narkomaaniaraviregister

Juhend andmeandjatele

Psühhiaatria raviteenuse osutajal on kohustus esitada Narkomaaniaraviregistrile iga narkomaaniaravi episoodi kohta ravi alustamise teatis (ühe nädala jooksul pärast patsiendi ravile pöördumist) ja ravi lõpetamise teatis (30 päeva jooksul pärast ravi lõpetamist, katkestamist või patsiendi edasisuunamist) (Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus § 11; Narkomaaniaraviregistri põhimäärus § 8). Raviteatise täitja identifitseerib ennast ID-kaardiga ja järgib vastutava töötleja juhiseid.

Ravi alustamise teatise täitmine

Välja täitmiseks sisesta tekst või tee menüüst sobiv valik. Rippmenüüd avanevad tühjale väljale klõpsates. Liigu kursoriga, sest <Enter>-ile vajutamine käivitab teatise saatmise ja annab ekraanile eksitavaid veateateid, mis käivad väljade kohta, mille täitmiseni ei ole veel jõutud. Kõikide väljade täitmine on kohustuslik. Väli jääb tühjaks vaid siis, kui patsiendil vastavat tunnust ei esine.

1 Patsient

Kas Eesti isikukood on teada?

Tee valik sobivat nuppu klõpsates:

ei
jah

1.1 Eesti isikukood

Kui Eesti isikukood on teada, sisesta patsiendi dokumendi alusel tema isikukood.

1.2 Sünniaeg

Kui isikukood on sisestatud, täidetakse sünniaeg automaatselt isikukoodi järgi ja näidatakse ekraanil. Kui isikukood ei ole teada, sisesta sünniaeg (pp.kk.aaaa) või vali kalendrist.

1.3 Eesnimi (nimed)

Sisesta patsiendi eesnimi (nimed). Võib valida väikesed või suured tähed, ekraanile ilmub suurte tähtedega.

1.4 Perekonnanimi (nimed)

Sisesta patsiendi perekonnanimi (nimed). Võib valida väikesed või suured tähed, ekraanile ilmub suurte tähtedega.

1.5 Sugu

Kui isikukood on sisestatud, täidetakse sugu automaatselt isikukoodi järgi ja näidatakse ekraanil. Kui isikukood ei ole teada, vali sobivat nuppu klõpsates:

mees
naine
teadmata

1.6 Rahvus

Tähestikjärjestuses rippmenüüst vali patsiendi ütluse järgi tema rahvus. Kui sobivat rahvust menüüs ei ole, vali "muu rahvus" menüü eelviimaselt realt. Kui rahvus ei ole teada, vali "teadmata" (menüüs viimane).

1.7 Sünniriik

Tähestikjärjestuses rippmenüüst vali patsiendi ütluse järgi riik, kus ta on sündinud. Kui sobivat riiki menüüs ei ole, vali "muu riik" menüü eelviimaselt realt. Kui sünniriik ei ole teada, vali "teadmata" (menüüs viimane).

1.8 Elukohariik

Elukohariigi väljas seisab vaikumisi "Eesti". Kui patsient elab Eestis, mine järgmise välja juurde, kui mitte, siis vali rippmenüüst "muu riik". Elukohariik täidetakse patsiendi ütluse järgi.

1.9 Elukoht maakonna/valla/linna/linnaosa/alevi täpsusega

Elukoha täpsema määratluse saab sisestada vaid Eesti puhul. Väljale "Vali" klõpsates avaneb hierarhiline menüü, kust vali kõigepealt maakond, siis vald/linn/linnaosa/alev. Tallinna ja Kohtla-Järve puhul vali ka linnaosa, kui see on teada.

Ära klõpsa nupule, kui selle ees seisab >, vaid mine viimasele teadaolevale tasandile ja alles siis klõpsa nupule.

Jälgi vallasiseseid linnu (Abja-Paluoja, Antsla, Elva, Jõgeva, Jõhvi, Kallaste, Karksi-Nuia, Kehra, Kilingi-Nõmme, Kiviõli, Kunda, Kuressaare, Kärddla, Lihula, Mustvee, Mõisaküla, Otepää, Paldiski, Põltsamaa, Põlva, Püssi, Rapla, Räpina, Saue, Sindi, Suure-Jaani, Tamsalu, Tapa, Tõrva, Türi, Valga, Võhma); vallasiseseid aleveid (Aegviidu, Järva-Jaani, Järvakandi, Kohila, Kohtla-Nõmme, Märjamaa, Pärnu-Jaagupi, Tootsi, Väandra); linnasiseseid linnu (Haapsalu, Narva-Jõesuu, Paide, Pärnu, Tartu); linnasiseseid aleveid (Lavassaare).

Kui elukoht ei ole teada, siis vali "elukoht teadmata" (menüüs viimane). Elukoht täidetakse patsiendi ütluse järgi.

1.10 Eluaseme tüüp

Rippmenüüst vali patsiendi ütluse järgi tema eluaseme tüüp:

püsiv elukoht
kindla elukohata/kodutu
kinnipidamisasutus/eeluurimisvangla
hooldeasutus/varjupaik
muu (täpsustada)
teadmata

Kui ükski valik ei sobi, vali "muu" menüü eelviimaselt realt ja täpsusta. Kui eluaseme tüüp ei ole teada, vali "teadmata" (menüüs viimane).

1.11 Sotsiaalne seisund

Rippmenüüst vali patsiendi ütluse järgi tema sotsiaalne seisund:

töötav
juhutöid tegev
(üli)õpilane
töötu
sotsiaaltoetustest elav/pensionil
kodune/lapsehoolduspuhkusel
muu (täpsustada)
teadmata

Kui ükski valik ei sobi, vali "muu" menüü eelviimaselt realt ja täpsusta. Kui sotsiaalne seisund ei ole teada, vali "teadmata" (menüüs viimane). Kui eluaseme tüüp on "kinnipidamisasutus/eeluurimisvangla", siis sotsiaalne seisund märgitakse automaatselt "kinnipeetav/vahistatu" ja väljad "leibkond" ja "leibkonnas alaealised" ei avane.

1.12 Haridus

Rippmenüüst vali patsiendi ütluse järgi tema kõrgeim lõpetatud haridustase:

algharidus/vähem
põhiharidus
keskharidus
kutsekesk(keskeri)haridus põhihariduse baasil
keskeriharidus keskhariduse baasil
rakenduskõrgharidus
ülikooliharidus
teadmata

Kui haridus ei ole teada, vali "teadmata" (menüüs viimane).

1.13 Leibkond (kellega koos elab ja majandab)

Rippmenüüst vali leibkond, kellega koos patsient elab ja majandab:

üks
päritoluperekond (vanemad/õed/vennad)
abikaasa/partner/lapsed
teised sugulased
sõbrad/tuttavad
muu
teadmata

Kui ükski valik ei sobi, vali "muu" menüü eelviimaselt realt. Kui leibkond ei ole teada, vali "teadmata" (menüüs viimane).

1.15 Leibkonnas alaealised

Patsiendi ütluse järgi tee valik sobivat nuppu klõpsates:

ei
jah
teadmata

Kui alaealistega koos elamine ei ole teada, vali "teadmata".

1.16 Ravikindlustus (Eesti Haigekassa)

Tee valik sobivat nuppu klõpsates:

ei
jah

2 Raviepisood

2.1 Põhidiagnoos (RHK-10)

Väljale "Vali" klõpsates avaneb hierarhiline RHK-10 klassifikaator, kust vali arsti määratud 5-kohaline diagnoos (RHK-10 F11–F16, F18, F19). Põhidiagnoos peab kuuluma psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäirete kategooriasse (F10–F19), v.a alkohol (F10) ja tubakas (F17).

2.2 Kaasuv diagnoos (RHK-10)

Väljale "Vali" klõpsates avaneb hierarhiline RHK-10 klassifikaator, kust vali arsti määratud kaasuv diagnoos, kui see esineb. Huvipakkuvad diagnoosid kuuluvad RHK-10 kategooriatesse A00–B99 (nakkus- ja parasiithaigused) ja F00–F99 (psüühika- ja käitumishäired). Valida saab kuni neli kaasuvat diagnoosi.

2.3 Ravile pöördumise kuupäev

Sisesta kujul pp.kk.aaaa või vali kalendrist kuupäev, millal patsient ilmus esimest korda visiidile.

Vanus ravile pöördumisel

Kui ravile pöördumise kuupäev on sisestatud, täidetakse vanus automaatselt ja näidatakse ekraanil.

2.4 Määratud ravi liik

Rippmenüüst vali ravi liik:

võõrutusravi (narkootikumide tarvitamise lõpetamine asendusravimiga või ilma)
säilitusravi (asendusravimi regulaarne manustamine ravi lõpetamise tähtajata)
pikaajaline struktureeritud raviprogramm/rehabilitatsioon
psühhoteraapia (eraldi teenusena)
psühhosotsiaalne nõustamine (eraldi teenusena)
psühhiaatri vastuvõtt
muu (täpsustada)

Kui ükski valik ei sobi, vali "muu" menüü viimaselt realt ja täpsusta.

2.5 Määratud asendusravim

Rippmenüüst vali asendusravimi kasutamine:

asendusravimit ei ole määratud
metadoon
buprenorfiin
buprenorfiin-naloksoon
muu (täpsustada)
teadmata

Kui ükski valik ei sobi, vali "muu" menüü eelviimaselt realt ja täpsusta. Kui asendusravim ei ole teada, vali "teadmata" (menüüs viimane).

2.6 Muud määratud ravimid

Sisesta tühjale väljale esimese määratud ravimi (siia ei kuulu asendusravimid) tekst. Pärast sisestust ilmub järgmine tühi väli, kuhu saab sisestada teise ravimi. Maksimaalselt saab sisestada neli ravimit eraldi väljadele.

2.7 Ravile suunaja/soovitaja

Rippmenüüst vali patsiendi ütluse järgi ravile suunaja/soovitaja:

perekond/sõbrad/pöördus ise
muu narkomaaniravi teenuse osutaja
kahjude vähendamise teenuse (sh SÜTIK) osutaja
muu ravi-/sotsiaalasutus
perearst
kohus
kriminaalhooldus
politsei
muu
teadmata

Kui ükski valik ei sobi, vali "muu" menüü eelviimaselt realt. Kui ravile suunaja/soovitaja ei ole teada, vali "teadmata" (menüüs viimane).

2.8 Ravi osutamise viis

Rippmenüüst vali ravi osutamise viis:

ambulatoorne ravi
päevaravi
statsionaarne ravi
perearst
muu (täpsustada)

Kui ükski valik ei sobi, vali "muu" menüü viimaselt realt ja täpsusta.

2.9 Kunagi varem saadud narkomaaniaravi

Tee valik sobivat nuppu klõpsates:

ei
jah
teadmata

"Varem" tähendab siin kogu eelneva elu jooksul.

2.10 Eelmise narkomaaniaravi liik

Väli avaneb vaid siis, kui patsient on varem saanud narkomaaniaravi. Rippmenüüst vali eelmise ravi liik:

võõrutusravi
säilitusravi
pikaajaline rehabilitatsioon
psühhosotsiaalne nõustamine
muu

Kui ükski valik ei sobi, vali "muu" menüü viimaselt realt.

2.11 Eelmise narkomaaniaravi saamise aasta

Sisesta eelmisele ravile pöördumise aasta (4-kohaline). Kui aasta ei ole teada, sisesta 9999.

3 Narkootikumide tarvitamine

3.1 Vanus mingi narkootikumi esmakordsel tarvitamisel (v.a alkohol)

Sisesta patsiendi ütluse järgi tema vanus ükskõik millise narkootikumi (v.a alkohol) esmakordsel tarvitamisel. Kui vanus ei ole teada, sisesta 99.

3.2 Põhinarkootikum

Tähestikjärjestuses rippmenüüst vali patsiendi ütluse järgi talle kõige rohkem probleeme valmistav narkootikum:

amfetamiin
barbituraadid
bensodiasepiinid
buprenorfiin
crack
efedriin
fentanüül/analoogid
GHB/GBL
hallutsinogeensed seemned
heroiin
kanep
ketamiin

kodeiin
kokaiinipulber
lenduvad lahustid (lahustid/liimid/lakid/muud)
LSD
MDMA (ecstasy)/muud derivaadid
metadoon
metamfetamiin
moonivedelik
morfiin
sünteetilised kannabinoidid
sünteetilised katinoonid (nt Alfa-PVP)
muud narkootikumid (täpsustada)
teadmata

Põhinarkootikum peab olema vastavuses arsti määratud diagnoosiga. Metadoon või buprenorfiin märgitakse juhul, kui patsient tarvitab neid mitte asendus- või võõrutusravis, vaid iseseisva illegaalse narkootikumina. Kui ükski valik ei sobi, vali "muud narkootikumid" menüü eelviimaselt realt ja täpsusta. Kui põhinarootikum ei ole teada, vali "teadmata" (menüüs viimane).

3.3 Vanus põhinarootikumi esmakordsel tarvitamisel

Sisesta patsiendi ütluse järgi vanus põhinarootikumi esmakordsel tarvitamisel. Kui vanus ei ole teada, sisesta 99.

3.4 Põhinarkootikumi tarvitamise viis

Rippmenüüst vali patsiendi ütluse järgi põhinarootikumi tarvitamise viis:

süstimine
allaneelamine
ninna tõmbamine
suitsetamine
aurude sissehingamine
nahakaudne
keelealune
muu (täpsustada)
teadmata

Kui ükski valik ei sobi, vali "muu" menüü eelviimaselt realt ja täpsusta. Kui põhinarootikumi tarvitamise viis ei ole teada, vali "teadmata" (menüüs viimane). Põhinarkootikumi tarvitamise viis peab olema vastavuses nimetatud narkootikumiga.

3.5 Põhinarkootikumi tarvitamise sagedus

Rippmenüüst vali patsiendi ütluse järgi põhinarootikumi tarvitamise sagedus:

iga päev
4–6 päeval nädalas
2–3 päeval nädalas
ühel päeval nädalas
1–3 päeval kuus
ei tarvitanud viimasel 30 päeval
teadmata

Kui põhinarootikumi tarvitamise sagedus ei ole teada, vali "teadmata" (menüüs viimane)

3.6 Mitme narkootikumi samaaegne tarvitamine

Tee valik sobivat nuppu klõpsates:

ei
jah
teadmata

Kui mitme narkootikumi samaaegne tarvitamine ei ole teada, vali "teadmata".

3.7 Teisene uimasti

Tähestikjärjestuses rippmenüüs on esitatud uimastite (k.a alkohol) loetelu. Vt põhinarkootikumide loetelu 3.2. Teiseste uimastite hulka kuulub alkohol, kuid ei kuulu tubakas ega retseptiravimid, mida patsient kasutab ravi otstarbel, ega uimastid, mida patsient kasutab, kuid need ei halvenda tema seisundit. Teisese uimasti väli avaneb vaid siis, kui patsient tarvitab mitut uimastit samaaegselt.

3.10 Muud viimase 30 päeva jooksul tarvitatud uimastid

Sisesta vaba tekstina muud uimastid, mida patsient viimase 30 päeva jooksul tarvitas.

3.11 Narkootikumi süstimine elu jooksul

Rippmenüüst vali patsiendi ütluse järgi, kas ja kui sageli ta on narkootikumi elu jooksul süstinud:

ei, mitte kunagi
jah, viimasel 30 päeval
jah, viimasel 12 kuul, kuid mitte viimasel 30 päeval
jah, kuid mitte viimasel 12 kuul
jah, aeg teadmata
patsient ei soovi vastata
teadmata

Kui narkootikumi süstimine ei ole teada, vali "teadmata" (menüüs viimane).

3.12 Vanus esmakordsel narkootikumi süstimisel

Väli avaneb vaid juhul, kui patsient on vastanud jaatavalt narkootikumi süstimise kohta. Sisesta patsiendi ütluse järgi tema vanus esmakordsel narkootikumi süstimisel. Kui vanus ei ole teada, sisesta 99.

3.13 Süstla või süstlanõela jagamine

Väli avaneb vaid juhul, kui patsient on vastanud jaatavalt narkootikumi süstimise kohta.

Rippmenüüst vali patsiendi ütluse järgi, kas ja kui sageli ta on süstlanõela jaganud:

ei, mitte kunagi
jah, viimasel 30 päeval
jah, viimasel 12 kuul, kuid mitte viimasel 30 päeval
jah, kuid mitte viimasel 12 kuul
jah, aeg teadmata
patsient ei soovi vastata
teadmata

Kui süstlanõela jagamine ei ole teada, vali "teadmata" (menüüs viimane).

3.14 Üledoosi kogemus viimasel 12 kuul

Patsiendi ütluse järgi tee valik sobivat nuppu klõpsates:

ei
jah
teadmata

Kui üledoosi kogemus ei ole teada, vali "teadmata".

3.15 Naloksooni kasutamise nõustamine

Rippmenüüst vali patsiendi ütluse järgi, kas ta on läbinud naloksooni kasutamise nõustamise ja omab naloksooni või mitte:

ei ole läbinud, ravile pöördumisel ei suunatud nõustamisele
ei ole läbinud, ravile pöördumisel suunati nõustamisele
nõustatud varem, omab naloksooni
nõustatud varem, ei oma naloksooni
teadmata

Kui naloksooni kasutamise nõustamine ei ole teada, vali "teadmata".

4 HIV ja HCV

4.1 HIV-testimine (v.a kodutest)

Rippmenüüst vali patsiendi ütluse järgi, kas ja kunas ta on teinud HIV-testi:

testitud viimasel 12 kuul
testitud, kuid mitte viimasel 12 kuul
testitud, aeg teadmata
ei ole kunagi testitud
patsient ei soovi vastata
teadmata

Kui HIV-testi tegemine ei ole teada, vali "teadmata".

4.2 HIV-testi kuupäev

Väli avaneb vaid juhul, kui patsient on vastanud jaatavalt HIV-testimise kohta. Patsiendi ütluse järgi sisesta või vali kalendrist tema HIV-testi tegemise kuupäev. Kui täpne kuupäev ei ole teada, saab sisestada mittetäieliku kuupäeva. Kui ka aasta ei ole teada, sisesta 9999.

4.3 HIV-staatus

Kui patsient on vastanud jaatavalt HIV-testi tegemise kohta, tee valik sobivat nuppu klõpsates:

negatiivne
positiivne (verifitseeritud)
teadmata

Kui HIV-testi tulemus ei ole teada, vali "teadmata".

4.4 HCV-testimine

Rippmenüüst vali patsiendi ütluse järgi, kas ja kunas ta on teinud HCV-testi:

testitud viimasel 12 kuul
testitud, kuid mitte viimasel 12 kuul
testitud, aeg teadmata
ei ole kunagi testitud
patsient ei soovi vastata
teadmata

Kui HCV-testi tegemine ei ole teada, vali "teadmata".

4.5 HCV-testi kuupäev

Väli avaneb vaid juhul, kui patsient on vastanud jaatavalt HCV-testimise kohta. Patsiendi ütluse järgi sisesta või vali kalendrist tema HCV-testi tegemise kuupäev. Kui täpne kuupäev ei ole teada, saab sisestada mittetäieliku kuupäeva. Kui ka aasta ei ole teada, sisesta 9999.

4.6 HCV-staatus

Kui patsient on vastanud jaatavalt HCV-testi tegemise kohta, tee valik sobivat nuppu klõpsates:

negatiivne
positiivne (verifitseeritud)
teadmata

Kui HCV-testi tulemus ei ole teada, vali "teadmata".

5 Raviteatise täitja

5.1 Raviasutuse nimi

Tühjale väljale hiirega klõpsates avaneb rippmenüü, kust vali raviasutus:

Aasa Kliinik
CitoMed
Corrigo
Ida-Viru Keskhaigla
Lääne-Tallinna Keskhaigla
Narva Haigla
Narva Sõltuvuste Ravikeskus
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Pärnu Haigla
Tallinna Lastehaigla
Tallinna Vangla
Tartu Vangla
Tartu Ülikooli Kliinikum
Tervisekeskus Elulootus
Viljandi Haigla
Wismari Haigla
muu (täpsustada)

Kui ükski valik ei sobi, vali "muu" menüü viimaselt realt ja täpsusta.

5.2 Raviarsti tervishoiutöötajate registri kood

Sisesta raviarsti tervishoiutöötajate registri kood.

5.3 Raviteatise täitja nimi

Raviteatise täitja nimi võetakse automaatselt ID-kaardilt.

Raviteatise täitja isikukood

Raviteatise täitja isikukood võetakse automaatselt ID-kaardilt.

5.4 Raviteatise täitja telefon

Sisesta raviteatise täitja telefoninumber.

5.5 Raviteatise täitja amet

Sisesta raviteatise täitja amet.

5.6 Raviteatise täitmise kuupäev

Kuupäeva väli täidetakse automaatselt.

5.7 Märkused

Vaba tekstina võib sisestada täiendavat infot, mida peetakse vajalikuks.

Ravi lõpetamise teatise täitmine

Välja täitmiseks sisesta tekst või tee menüüst sobiv valik. Rippmenüüd avanevad tühjale väljale klõpsates. Liigu kursoriga, sest <Enter>-ile vajutamine käivitab teatise saatmise ja annab ekraanile eksitavaid veateateid, mis käivad väljade kohta, mille täitmiseni ei ole veel jõutud. Kõikide väljade täitmine on kohustuslik. Väli jääb tühjaks vaid siis, kui patsiendil vastavat tunnust ei esine.

6 Patsient

Kas Eesti isikukood on teada?

Tee valik sobivat nuppu klõpsates:

ei

jah

6.1 Eesti isikukood

Kui Eesti isikukood on teada, sisesta patsiendi dokumendi alusel tema isikukood.

6.2 Sünniaeg

Kui isikukood on sisestatud, täidetakse sünniaeg automaatselt isikukoodi järgi ja näidatakse ekraanil. Kui isikukood ei ole teada, sisesta sünniaeg (pp.kk.aaaa) või vali kalendrist.

6.3 Eesnimi (nimed)

Sisesta patsiendi eesnimi (nimed). Võib valida väikesed või suured tähed, ekraanile ilmub suurte tähtedega.

6.4 Perekonnanimi (nimed)

Sisesta patsiendi perekonnanimi (nimed). Võib valida väikesed või suured tähed, ekraanile ilmub suurte tähtedega.

6.5 Ravile pöördumise kuupäev

Sisesta kujul pp.kk.aaaa või vali kalendrist kuupäev, kui patsient ilmus esimest korda visiidile.

Vanus ravile pöördumisel

Kui ravile pöördumise kuupäev on sisestatud, täidetakse vanus automaatselt ja näidatakse ekraanil.

6.6 Määratud ravi liik

Rippmenüüst vali ravi liik:

võõrutusravi (narkootikumide tarvitamise lõpetamine asendusravimiga või ilma)

säilitusravi (asendusravimi regulaarne manustamine ravi lõpetamise tähtajata)

pikaajaline struktureeritud raviprogramm/rehabilitatsioon

psühhoteraapia (eraldi teenusena)

psühhosotsiaalne nõustamine (eraldi teenusena)

psühhiaatri vastuvõtt

muu (täpsustada)

Kui ükski valik ei sobi, vali "muu" menüü viimaselt realt ja täpsusta.

6.7 Ravi lõpetamise kuupäev

Sisesta kujul pp.kk.aaaa või vali kalendrist kuupäev, kui ravi lõppes.

6.8 Ravi lõpetamise põhjus

Rippmenüüst vali ravi lõpetamise põhjus:

raviplaan täidetud
patsiendi otsus lõpetada
ebasobiv käitumine
korduv uimastite tarvitamine ravi ajal
mitteilmumine ravile kolme kuu jooksul
suunatud teisele teenusele samas ravigasutuses
suunatud teise ravigasutusse/kinnipidamisasutusse
vabanemine kinnipidamisasutusest
Eestist lahkunud
surnud
muu (täpsustada)

Kui ükski valik ei sobi, vali "muu" menüü viimaselt realt ja täpsusta.

6.9 Sotsiaalne seisund

Rippmenüüst vali patsiendi ütluse järgi tema sotsiaalne seisund:

töötav
juhutoid tegev
(üli)õpilane
töötu
sotsiaaltoetustest elav/pensionil
kodune/lapsehoolduspuhkusel
muu (täpsustada)
teadmata

Kui ükski valik ei sobi, vali "muu" menüü eelviimaselt realt ja täpsusta. Kui sotsiaalne seisund ei ole teada, vali "teadmata" (menüüs viimane).

7 Raviteatise täitja

7.1 Ravigasutuse nimi

Tühjale väljale hiirega klõpsates avaneb rippmenüü, kust vali ravigasutus:

Aasa Kliinik
CitoMed
Corrigo
Ida-Viru Keskhaigla
Lääne-Tallinna Keskhaigla
Narva Haigla
Narva Sõltuvuste Ravikeskus
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Pärnu Haigla
Tallinna Lastehaigla
Tallinna Vangla
Tartu Vangla
Tartu Ülikooli Kliinikum
Tervisekeskus Elulootus
Viljandi Haigla
Wismari Haigla
muu (täpsustada)

Kui ükski valik ei sobi, vali "muu" menüü viimaselt realt ja täpsusta.

7.2 Raviarsti tervishoiutöötajate registri kood

Sisesta raviarsti tervishoiutöötajate registri kood.

7.3 Raviteatise täitja nimi

Raviteatise täitja nimi võetakse automaatselt ID-kaardilt.

Raviteatise täitja isikukood

Raviteatise täitja isikukood võetakse automaatselt ID-kaardilt.

7.4 Raviteatise täitja telefon

Sisesta raviteatise täitja telefoninumber.

7.5 Raviteatise täitja amet

Sisesta raviteatise täitja amet.

7.6 Raviteatise täitmise kuupäev

Kuupäeva väli täidetakse automaatselt.

7.7 Märkused

Vaba tekstina võib sisestada täiendavat infot, mida peetakse vajalikuks